



PHÂN BÓN THÀNH TÂM

6D - Đường số 2 - P. Bình An - Q2 - TP HCM
Tel: (028) 629 11 767
Fax: (028) 629 11 756
www.phanbonthanhtam.vn

84 Yên Phụ - P. Yên Phụ - Q. Tây Hồ - TP Hà Nội | Ấp Dông Sỏi - Xã An Tây - TX Bến Cát - T. Bình Dương | Mỹ Hiệp 1- Xã Tân Tiến - TP Vị Thanh - T. Hậu Giang

KỸ THUẬT TRỒNG VÀ CHĂM SÓC CÂY BẦU

Cây bầu còn gọi là bầu nậm, bầu đất, bầu canh. Cây bầu có tên khoa học là *Lagernaria siceraria (Molina) Standl.*, thuộc họ bầu bí (*Cucurbitaceae*). Cây bầu có nguồn gốc Châu Phi và Ấn Độ, ngày nay được trồng rộng rãi ở các nước vùng nhiệt đới và á nhiệt đới trên toàn thế giới.

Quả bầu vừa là món ăn ngon, mát bổ vừa là thuốc chữa bệnh.

1. Thời vụ trồng

Bầu có thể trồng quanh năm nhưng mùa nắng cây ít bệnh và cho năng suất cao hơn.

Vụ Xuân: Gieo trồng tháng 1

Vụ Hè: Gieo trồng vào tháng 5, tháng 6

Vụ Thu: Gieo trồng vào tháng 9, tháng 10

Vụ Đông: Nếu ở vùng núi âm thì trồng vào đầu tháng 10 sau khi thu hoạch lúa mùa sớm.

2. Mật độ, khoảng cách.

Luống rộng 0,7 m, tâm luống này cách tâm luống kia 1 m, luống cao 0,3 m (tùy theo mùa vụ và mực thủy cấp). Trồng 1 hàng, cây cách cây 0,8 m. Lượng hạt giống cần cho 1 ha: 300-400 g.

Cách trồng: Đào hốc kích thước 50 x 50 x 30cm, hốc cách nhau 1m.

3. Bón phân cho cây bầu

Bón lót: Bón 200-500 g phân hữu cơ Thành Tâm và khoảng 100 g phân hỗn hợp NPK cho mỗi hốc trước khi trồng.



PHÂN BÓN THÀNH TÂM

- 6D - Đường số 2 - P. Bình An - Q2 - TP HCM
- Tel: (028) 629 11 767
- Fax: (028) 629 11 756
- www.phanbonthanhtam.vn

84 Yên Phụ - P. Yên Phụ - Q. Tây Hồ - TP Hà Nội | Ấp Dông Sỏi - Xã An Tây - TX Bến Cát - T. Bình Dương | Mỹ Hiệp 1 - Xã Tân Tiến - TP Vị Thanh - T. Hậu Giang

Phân hữu cơ Thành Tâm có chứa đầy đủ các chất dinh dưỡng đa lượng N, P, K (3:2:3) cần thiết cho cây trồng. Ngoài ra còn có các nguyên tố trung lượng và vi lượng ở dạng dễ hấp thu giúp cây trồng phát triển cân đối như Zn 40 ppm, Cu 50 ppm, B 70 ppm, Mn 30 ppm và Fe 30 ppm. Trong phân bón hữu cơ Thành Tâm, kết hợp cùng công nghệ tan chậm, các chất dinh dưỡng sẽ được phân giải từ từ để có thể cung cấp dinh dưỡng cho cây trồng trong thời gian dài nhằm đảm bảo đáp ứng được nhu cầu dinh dưỡng của cây trồng trong suốt thời gian sinh trưởng của cây. Phân bón hữu cơ Thành Tâm giúp cây trồng phát triển cân đối, ổn định, bền vững, giúp tăng chất lượng nông sản, tăng hàm lượng dinh dưỡng, cung cấp chất mùn cho đất, giúp cân bằng vi sinh vật trong đất, hạn chế xói mòn và rửa trôi đất, giúp cải tạo đất trồng, tiết kiệm nước tưới tiêu, không gây ô nhiễm môi trường, giúp hạn chế sử dụng phân bón vô cơ.

Bón thúc:

Bón thúc cho bầu vào hai giai đoạn cần thiết sau:

- Giai đoạn tăng trưởng: Kể từ khi trồng đến khi bầu lên giàn (60 ngày sau khi trồng). Bón thúc thường xuyên mỗi tuần một lần để chuẩn bị cơ sở vật chất cho cây ra hoa kết trái.

Lượng bón trên 1 hốc: 10 g NPK

Sau khi tưới phân nên tưới nước lại để tránh phân làm cháy rễ cây.

- Giai đoạn ra hoa, đậu quả: Bón thúc nuôi quả 7-10 ngày một lần với lượng phân gia tăng dần để quả to và nhiều quả.

- Trong suốt thời gian canh tác (130-140 ngày) mỗi hốc bón từ 1-1,5 kg NPK.

- Phân bón được hòa tan vào nước để tưới hoặc bón vào gốc, rạch rãnh cách gốc 10-15 cm sau đó bón phân vào, dùng cuốc vun nhẹ kết hợp với vun gốc cho cây.



PHÂN BÓN THÀNH TÂM

- 6D - Đường số 2 - P. Bình An - Q2 - TP HCM
- Tel: (028) 629 11 767
- Fax: (028) 629 11 756
- www.phanbonthanhtam.vn

84 Yên Phụ - P. Yên Phụ - Q. Tây Hồ - TP Hà Nội | Ấp Dông Sỏi - Xã An Tây - TX Bến Cát - T. Bình Dương | Mỹ Hiệp 1 - Xã Tân Tiến - TP Vị Thanh - T. Hậu Giang

Trường hợp canh tác theo các hướng sạch, an toàn, hữu cơ, bà con có thể

thay thế hoàn toàn lượng phân NPK mỗi lần bón bằng phân bón hữu cơ Thành Tâm với lượng các lần bón nhiều hơn 2 lần lượng bón NPK. Bằng cách đó, cây luôn được cung cấp đầy đủ các chất dinh dưỡng, các nguyên tố trung, vi lượng đầy đủ để phát triển, ra hoa, kết trái tối ưu, hạn chế tối đa hiện tượng dư thừa đạm, dư thừa phân bón, gây ô nhiễm đất, ô nhiễm nguồn nước, gây dư thừa nitrat và các chất hóa học độc hại trong sản phẩm. Bón hoàn toàn phân bón hữu cơ Thành Tâm cũng giúp nâng cao chất lượng nông sản sau thu hoạch, giúp nông sản tươi ngon hơn, giòn ngọt và an toàn, cho cả người trồng, người sử dụng và môi trường tự nhiên.

4. Chăm sóc:

Trới nước:

Bầu cần nhiều nước, do đó phải trới thường xuyên 1 - 2 lần/ngày cho đủ ẩm. Lượng nước trới cần gia tăng khi bầu ra quả.

Lấp dây, làm giàn:

Làm giàn cho cây bầu khi bầu mọc dài được 1m bắt đầu khoanh dây vòng gốc, lấy đất chặn lên ngay đốt, cách 1 - 2 đốt lại chặn đất để tranh thủ cho bầu ra rễ bất định, tăng khả năng thu hút dinh dưỡng nuôi quả sau này. Trồng được 2 tháng mới nương dây cho cây bầu leo giàn, cần để dây ở thế tự nhiên, không lật úp hay xoắn dây. Nên làm giàn bằng để cây bầu đủ diện tích bò, nếu giàn không thích hợp hay quá nhỏ không đủ để bầu bò, bầu cho ít quả hay thay đổi dạng quả và kích thước quả, không đạt tiêu chuẩn quả thương phẩm của giống. Cây bầu vừa lên giàn là trổ hoa đậu quả, 75-90 ngày sau khi trồng cây bầu bắt đầu cho thu hoạch.

Tỉa nhánh, bấm ngọn:

Cây bầu ra nhiều dây nhánh và mang trái ở dây nhánh. Các dây nhánh ở đoạn thân từ gốc lên đến giàn nên tỉa bỏ để gốc được thoáng. Khi bầu lên giàn thì không tỉa



PHÂN BÓN THÀNH TÂM

- 6D - Đường số 2 - P. Bình An - Q2 - TP HCM
- Tel: (028) 629 11 767
- Fax: (028) 629 11 756
- www.phanbonthanhtam.vn

84 Yên Phụ - P. Yên Phụ - Q. Tây Hồ - TP Hà Nội | Ấp Dông Sỏi - Xã An Tây - TX Bến Cát - T. Bình Dương | Mỹ Hiệp 1 - Xã Tân Tiến - TP Vị Thanh - T. Hậu Giang
nữa để dây nhánh cho quả. Lấy được quả trên nhánh nào thì bấm ngọn để quả phát triển lớn và bầu tiếp tục cho quả ở dây nhánh khác.

5. Phòng trừ sâu bệnh:

Sâu hại cây bầu gồm ruồi đục lá, rầy mềm, bọ rầy dưa. Phun thuốc khi thấy các côn trùng này xuất hiện, nên sử dụng các loại thuốc trừ sâu bệnh sinh học nhằm bảo vệ sức khỏe người trồng và người sử dụng.

Bệnh gây hại cho cây bầu thường gặp như bệnh héo cây con, bệnh khảm, bệnh thán thư, bệnh phấn trắng. Bà con nếu không phun thuốc thì có thể nhổ bỏ cây bệnh hay ngắt bỏ lá bệnh nếu có.

6. Thu hoạch:

Quả bầu phát triển 10-12 ngày sau khi trổ hoa là có thể thu hoạch. Cắt quả khi vỏ còn mềm, quả thon dài, hạt bên trong vừa tượng là ngon. Không nên để quả già, vỏ hạt bên trong đã cứng, ăn kém ngon và cây mau tàn. Nếu chăm sóc tốt, giàn bầu 100 gốc cho thu quả 2-3 ngày/lần; lúc rộ thu hoạch mỗi ngày, thu liên tục 60 ngày cây bầu mới tàn. Mỗi gốc trung bình cho từ 10-15 quả.

Quý khách hàng có nhu cầu tư vấn, sử dụng phân bón hữu cơ Thành Tâm xin liên hệ theo số: 0919197297, Facebook: phanbonthanhtam hoặc theo Email: info@phanbonthanhtam.vn.

PHÂN BÓN THÀNH TÂM